

VARIETADES DE SANDÍA MINI ÉPOCAS DE PLANTACIÓN



Época	Fecha de Siembra	Fecha de plantación	Recolección
1ª	14 de abril	29 de mayo	22 de agosto y 3 de septiembre
2ª	12 de mayo	25 de junio	17 de septiembre

Marco de plantación 2,50 x 0,80 m (5.000 plantas/ha)


Nº	Varietal	C. Comercial
1	Bibo	Syngenta
2	Master	Syngenta
3	Boston	Nunhems
4	Minipool	Hazera
5	Miniazabache	Intersemillas (Polinizadora)

Resultados de producción

Época	Varietal	Producción comercial		Peso del fruto (g)		
		t/ha	Nº frutos/ha	Medio	Máximo	Mínimo
29-may	Bibo	25,58	11111	2302	3320	1610
	Boston	61,63	11667	5283	7170	1660
	Master	48,85	21389	2284	3340	1490
	Minipool	64,36	20278	3174	5310	1980
MEDIA		50,10	16111	3261	4785	1685
25-jun	Bibo	19,08	8611	2215	3390	1330
	Boston	43,64	7500	5819	7960	3110
	Master	31,81	13333	2386	3660	1590
	Minipool	44,54	12778	3486	6240	1370
MEDIA		34,77	10556	3476	5313	1850



Distribución (%) de los frutos en función del peso medio (g) de cada variedad



Características de los frutos

Variedad	Peso medio (g)	Diámetro (cm)	Altura (cm)	Grosor piel (cm)	Semillas
1 Bibo	2477	15,76	18,56	6,04	
2 Master	2326	16,16	17,22	7,10	
3 Boston	6200	22,47	23,63	13,70	
4 Minipool	3162	17,83	18,92	9,55	Negras
MEDIA	3541	18,05	19,58	9,10	

Si analizamos los resultados de producción de las diferentes variedades en las dos épocas de plantación, observamos que en todas las variedades la mayor producción se obtiene en la fecha de plantación más temprana. Sin embargo, no se observa influencia de la época de plantación en el peso medio del fruto.

Independientemente de la época de plantación, las variedades más productivas han sido Boston y Minipool, que a su vez son las de mayor peso medio del fruto.

Para mercado de exportación se busca una sandía de 2 a 2,5 kg de peso. Para este destino las variedades que más se ajustan son Bibo y Master.

BIBO (SYNGENTA)



MASTER (SYNGENTA)



MINIPOOL (HAZERA)

