

VARIETADES DE PIMIENTO MORRÓN, CADREITA 2009

Densidad de plantación: 35.714 plantas/ha (1,60 x 0,35), 2 filas por mesa.

Fecha de Siembra: 16 de marzo.

Fecha de Plantación: 20 de mayo.


Fechas de Recolección: 3 de septiembre, 22 de septiembre y 20 de octubre.

| Nombre | Casa comercial |
|-------------|----------------|
| Alar | Fito |
| Bailarina | Agricultor |
| Bola Puente | Agricultor |
| Cierzo | R. Arnedo |
| Corera | R. Arnedo |
| Es-02-150 | Esasem |
| Falces | ITGA |
| Lerin | ITGA |
| Luesia | R. Arnedo |
| Moroto | Agricultor |

En rojo variedades ensayadas por primera vez

Resultados de producción

| Nombre | Producción-1ª Rec | | Producción comercial (t/ha) | Podrido (Nº Fr/m) | Soleado Nº Fr/m² | Destrio (t/ha) | Lacio (t/ha) | Peso fruto (g) |
|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| | t/ha | % | | | | | | |
| Cierzo | 22,10 | 42,02 | 52,60 | 0,00 | 5,74 | 1,69 | 2,14 | 160,20 |
| Es-02-150 | 27,66 | 58,86 | 46,99 | 0,18 | 17,37 | 2,32 | 2,30 | 117,07 |
| Luesia | 11,25 | 24,29 | 46,32 | 0,22 | 3,14 | 3,13 | 0,73 | 118,93 |
| Alar | 13,59 | 31,36 | 43,33 | 0,27 | 6,71 | 4,05 | 0,80 | 109,73 |
| Falces | 1,79 | 4,65 | 38,40 | 0,36 | 5,43 | 0,74 | 1,02 | 162,88 |
| Corera | 11,81 | 33,95 | 34,79 | 0,13 | 9,32 | 3,16 | 1,19 | 164,87 |
| Lerin | 1,94 | 6,30 | 30,74 | 0,09 | 14,72 | 1,17 | 1,41 | 188,47 |
| Bailarina | 9,42 | 37,29 | 25,27 | 0,40 | 7,88 | 1,92 | 1,35 | 106,80 |
| Moroto | 2,53 | 10,03 | 25,24 | 0,67 | 6,70 | 0,96 | 0,98 | 213,13 |
| Bola Puente | 2,50 | 10,43 | 23,92 | 0,31 | 10,64 | 2,46 | 1,19 | 146,04 |
| MEDIA | 10,46 | 25,92 | 36,76 | 0,26 | 8,77 | 2,16 | 1,31 | 148,81 |



Características del fruto

| Nombre | Peso medio fruto | Longitud (cm) | Anchura (mm) | Grosor carne (mm) | % corazón | % carne |
|--------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Alar | 103,93 | 6,85 | 63,73 | 5,10 | 36,05 | 63,95 |
| Bailarina | 110,67 | 7,05 | 67,37 | 5,65 | 29,28 | 70,72 |
| Bola | 99,87 | 4,45 | 69,77 | 6,47 | 34,78 | 65,22 |
| Cierzo | 163,33 | 6,42 | 81,90 | 5,18 | 34,86 | 65,14 |
| Corera | 159,33 | 8,01 | 72,93 | 6,03 | 30,00 | 70,00 |
| Es-02-150 | 164,13 | 12,27 | 63,57 | 4,63 | 20,88 | 79,12 |
| Falces | 124,13 | 9,05 | 61,57 | 5,02 | 20,57 | 79,43 |
| Lerin | 141,67 | 6,10 | 76,63 | 5,66 | 34,64 | 65,36 |
| Luesia | 171,33 | 7,12 | 78,27 | 5,33 | 31,05 | 68,95 |
| Moroto | 126,27 | 6,63 | 69,67 | 4,63 | 40,02 | 59,98 |
| MEDIA | 191,93 | 8,11 | 82,63 | 6,17 | 28,79 | 71,21 |

La variedad más productiva ha sido Cierzo con 52,60 t/ha. En el resto de variedades la producción osciló entre 46,99 t/ha de Gitano y 23,92 t/ha de Bola Puente.

Respecto al peso medio del fruto, el valor más alto, superior a 200 gramos por fruto, correspondió a la variedad Moroto. En el extremo contrario, se sitúan Bailarina y Alar.

Dentro del pimiento Morrón destaca la variedad Cierzo que está sustituyendo a Luesia, cultivada tradicionalmente, por su mayor tamaño de fruto. Destaca la variedad nueva ES-02-150, muy productiva pero con un tamaño de fruto similar a Luesia.



Alar (Fito)



Bailarina (Agricultor)



Bola Puente (Agricultor)



Cierzo (R. Arnedo)



Corera (R. Arnedo)



Falces (ITGA)



Lerin (ITGA)



Moroto (Agricultor)



Luesia (R. Arnedo)