

FORMAS DE RECOLECCIÓN EN ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA CADREITA 2008-2009

Plantación	12 de agosto de 2008
Variedad	Selección ITGA
Formas de recolección	A- Calibre de 60-70 mm 1 vez por semana B- Calibre de 40-70 mm cada 10 días

Fechas de recolección	Calibre 40-70 mm	Calibre 60-70 mm
Marzo 2009	25	25
Abril 2009	6, 17 y 27	1, 8, 15, 22 y 28
Mayo 2009	7, 18 y 28	5, 13, 20 y 26
Junio 2009	8 y 16	2, 8 y 16

Resultados de producción

Calibre	Producción por ha		Producción por planta		Peso capítulo (g)	Arraigue (%)
	Capítulos	t/ha	Capítulos	kg		
A 60-70 mm	202480	25,61	26,86	3,40	126,58	84,44
B 40-70 mm	231349	22,94	29,90	2,96	100,68	86,67
MEDIA	216915	24,27	28,38	3,18	113,63	85,56

Porcentajes de producción durante el ciclo de cultivo

Calibre	Marzo	Abril	Mayo	Junio
A 60-70 mm	4,64	22,65	35,83	36,87
B 40-70 mm	8,97	21,81	34,47	34,76

Evolución del peso medio del capítulo (g)

Calibre	Marzo	Abril	Mayo	Junio
A 60-70 mm	168,51	119,93	132,54	110,32
B 40-70 mm	142,17	92,22	94,50	103,12

Aunque el número de capítulos con recolección cada 10 días haya sido superior, el menor peso de éstos hace que con la recolección de capítulos cada semana se obtenga una mayor producción, 25,61 t/ha frente a 22,94 t/ha en el sistema B (capítulos de 40 a 70 mm).